

Labo	Vaccin	Espèce cible	Sérotype	Présentation	Volume 1 dose	Délai 1 ^{ère} et 2 ^{ème} injection	Délai acquisition immunité	Voie d'administration	Age minimum de vaccination
BOEHRINGER INGELHEIM	BLUEVAC-1	ovins bovins	1	Boîte de 1 flacon de 50 ml Boîte de 1 flacon de 100 ml Boîte de 1 flacon de 250 ml	ovins : 2 ml bovins : 4 ml	ovins et bovins : 3 semaines d'intervalle	ovin : 3 semaines après 2 ^{ème} injection bovin : 4 semaines	sous-cutanée	Ovins : 2,5 mois Bovins : 2 mois
VIRBAC	SYVAZUL 1	ovins	1	Boîte de 1 flacon de 100 doses	2 ml	3 semaines	21 jours après 2 ^{ème} injection	sous-cutanée	3 mois
FORT DODGE	ZULVAC 8 BOVIS	bovins	8	Boîte de 1 flacon de 10 doses. Boîte de 1 flacon de 50 doses	2 ml	3 semaines	25 jours après 2 ^{ème} injection	intramusculaire	2,5 mois
FORT DODGE	ZULVAC 8 OVIS	ovins	8	Boîte de 1 flacon de 50 doses Boîte de 1 flacon de 120 doses	2 ml	3 semaines	25 jours après 2 ^{ème} injection		1 mois
MERIAL	BTVPUR ALSAP 2	ovins	2						
MERIAL	BTVPUR ALSAP 4	ovins	4						
MERIAL	BTVPUR ALSAP 2-4	ovins	2 - 4						
MERIAL	BTVPUR AISAP 8	ovins et bovins	8	Boîte de 10 flacons de 100 doses	ovins et bovins : 1 ml	ovins : 1 seule injection bovins : 2ème injection à 1 mois d'intervalle	ovins : 31 jours après vaccination bovins : 23 jours après 2 ^{ème} vaccination	sous-cutanée	Ovins et bovins : une injection à partir de l'âge de 1 mois excepté chez les jeunes nés de mères vaccinées (2,5 mois dans ce cas)
INTERVET	BOVILIS BTV8	ovins et bovins	8	Flacon verre ou polyéthylène téréphthalate (PET) de 10, 20, 50, 100, 250, ou 500 ml	ovins et bovins : 1 ml	ovins : 1 dose unique de 1 ml bovins : 2 doses de 1 ml à 3 semaines d'intervalle	ovins et bovins : 3 semaines après vaccination	sous-cutanée	1 mois
FORT DODGE	ZULVAC 1 BOVINS	bovins	1	Flacon verre hydrolytique de type II de 100 ml (50 doses)	2 ml	2 injections d'une dose de 2 ml à 3 semaines d'intervalle	15 jours après 2 ^{ème} dose	intramusculaire	2,5 mois
FORT DODGE	ZULVAC 1 OVINS	ovins	1	Flacon verre hydrolytique de type II de 250 ml (120 doses)	2 ml	2 injections d'une dose de 2 ml à 3 semaines d'intervalle	24 jours après 2 ^{ème} dose	sous-cutanée	1 mois